VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

SAÚDE

**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Preditores epidemiológicos e biológicos para desfecho desfavorável no tratamento da TB

Dra. Mariana Araújo Pereira
(IGM/FIOCRUZ-BA)

SAÚDE

**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

O QUE ABORDAREMOS HOJE?

- **O que influencia** no desfecho de tratamento anti-TB;
- **Principais desfechos desfavoráveis** de tratamento anti-TB;
- Quais são os **fatores ambientais e epidemiológicos** associados aos desfechos;
- Quais são os **fatores biológicos** associados aos desfechos;

CONTEXTUALIZAÇÃO

VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

10.8 milhões

de pessoas estão com tuberculose ativa no mundo

- **Fatores** que causam impacto na progressão e no **desfecho de tratamento anti-TB**.
 - Biológicos do hospedeiro;
 - Biológicos do patógeno;
 - Fatores ambientais/epidemiológicos/sociais;
- **Desfechos desfavoráveis:**
 - Falha de tratamento;
 - Casos Relapsos;
 - Óbito;

CONTEXTUALIZAÇÃO

VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

- A **associação** desses fatores entre si e com os desfechos de tratamento é **complexa** e exige uma investigação ampla;
- Novas abordagens precisam ser utilizadas para **identificar preditores de desfecho e guiar políticas públicas** a fim de melhorar o desfecho desses pacientes;

PREDITORES EPIDEMIOLÓGICOS DE DESFECHO DESFAVORÁVEIS

COORTE DO REPORT-BRAZIL E DADOS DO SINAN-TB

VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

RePORT-Brazil

SINAN-TB

PREDITORES EPIDEMIOLÓGICOS DE DESFECHO DESFAVORÁVEIS

DADOS DO SINAN-TB DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA

VII Workshop para o
controle da tuberculose
em Minas Gerais

PREDITORES EPIDEMIOLÓGICOS DE DESFECHO DESFAVORÁVEIS

DADOS DO SINAN-TB

VII Workshop para o
controle da tuberculose
em Minas Gerais

Ryuk et al. *BMC Infectious Diseases* (2024) 24:531
<https://doi.org/10.1186/s12879-024-09417-7> BMC Infectious Diseases

RESEARCH **Open Access**

Predictors of unsuccessful tuberculosis treatment outcomes in Brazil: an analysis of 259,484 patient records

Do Kyung Ryuk¹, Daniele M. Pelissari², Kleydson Alves³, Patricia Bartholomay Oliveira², Marcia C. Castro¹, Ted Cohen⁴, Mauro Sanchez⁵ and Nicolas A. Menzies^{1*}

Fig. 1 Unadjusted and adjusted odds ratios of unsuccessful treatment for each state, 2015–2018. Unadjusted odds ratios estimated from regression models including each exposure variable individually. Adjusted odds ratios estimated from a regression model including all exposure variables. Horizontal bars represent 95% confidence intervals for adjusted odds ratios

PREDITORES CLÍNICOS DE DESFECHO DESFAVORÁVEIS: anemia

DADOS DO REPORT-BRASIL

VII Workshop para o
controle da tuberculose
em Minas Gerais

PREDITORES CLÍNICOS DE DESFECHO DESFAVORÁVEIS: diabetes

DADOS DO REPORT-BRASIL

VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

J Infe
Publi
The
Mul
María
Artur
Anna
Solar
Prosp

6
2
1

PREDITORES MICROBIOLÓGICOS DE DESFECHO DESFAVORÁVEIS

DADOS DO SINAN

VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

Isoniazid monoresistance and anti-tuberculosis treatment outcome in persons with pulmonary tuberculosis in Brazil

Araujo-Pereira et al., 2023 | *Open Forum Infectious Diseases*

BACKGROUND: The high burden of drug-resistant tuberculosis (DR-TB) is a problem to achieve the goals of the End of TB Strategy by 2035. Whether isoniazid monoresistance (Hr) affects anti-TB treatment (ATT) outcomes remains unknown in high burden countries.

PARTICIPANTS: Pulmonary TB cases reported to the Brazilian National Notifiable Disease Information System, between June 2015-June 2019.

METHODS

- We evaluated determinants of ATT outcome according to drug-susceptibility testing results;
- Binomial logistic regression models were employed to evaluate whether Hr was associated with an unfavorable ATT outcome;
- The outcomes were defined as unfavorable (death or failure) or favorable (cure or treatment completion).

RESULTS:

- Among 60,804 TB cases reported, 21,197 (34.9%) were included in the study;
- The frequency of unfavorable outcomes was significantly higher in those with Hr in contrast to isoniazid-sensitive cases (9.1% vs 3.05%, $p < 0.001$).
- Using a binomial logistic regression model, Hr was independently associated with unfavorable outcomes (OR: 3.34 [95%CI: 2.06-5.40], $p < 0.001$).

CONCLUSION: Hr detected prior to ATT was predictive of unfavorable outcomes at the national level in Brazil. Our data reinforce the need for high TB burden countries to prioritize DST to detect Hr. Effective treatment regimens for Hr-TB are needed to improve outcomes.

PREDITORES IMUNOLÓGICO DE DESFECHO DESFAVORÁVEIS

DADOS DO REPORT-BRASIL

VII Workshop para o
controle da tuberculose
em Minas Gerais

TAKE HOME

VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

- 1. Abordagem Integrativa:** A TB é uma doença **complexa**, e sua abordagem requer uma **avaliação integrada** que leve em consideração preditores epidemiológicos, clínicos, demográficos, sociais e biológicos.
- 2. Identificação de Preditores:** **Investimento** na área da pesquisa voltada para a exploração de dados e técnicas estatísticas para **identificar preditores significativos** que influenciam os desfechos do tratamento.
- 3. Prevenção e Educação:** Além do tratamento, **estratégias de prevenção e educação** são fundamentais para combater a TB, reduzir hábitos de consumo ruins, e consequentemente reduzir desfechos desfavoráveis.
- 4. Colaboração Global:** A luta contra a TB é um esforço global. A **colaboração** entre profissionais de saúde, pesquisadores e governos é **essencial** para enfrentar esse desafio.

OBRIGADA!

mariana.araujo@fiocruz.br

SAÚDE

**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.